


apb 4010

LA PEDIATRIA

PERIODICO MENSILE


Indirizzato al progresso degli studii sulle malattie dei bambini



SECONDA SERIE DI RICERCHE EMATOLOGICHE
NELL' ANEMIA DA LEISHMANIA

per il

Dott. SEBASTIANO CANNATA
(assistente)



(Estratto dal N. 10—1910).

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY	
Coll.	weTROmec
Call	pam
No.	WC715
	1910
	C225

NAPOLI

TIP. EDITRICE TOCCO E SALVIETTI
Via del Grande Archivio, 1 e 3
1910.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1000 S. EAST ASIAN

CHICAGO, ILL. 60607

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

LA PEDIATRIA

PERIODICO MENSILE

Indirizzato al progresso degli studii sulle malattie dei bambini

SECONDA SERIE DI RICERCHE EMATOLOGICHE NELL' ANEMIA DA LEISHMANIA

per il

Dott. SEBASTIANO CANNATA

(assistente)

(Estratto dal N. 10—1910).

NAPOLI

TIP. EDITRICE TOCCO E SALVIETTI

Via del Grande Archivio, 1 e 3

1910.

ISTITUTO DI CLINICA PEDIATRICA DELLA R. UNIV. DI PALERMO
DIRETTO DAL PROF. R. JEMMA

Le ricerche sul sangue di bambini affetti da anemia da Leishmania sono scarse, perchè da poco tempo questa entità morbosa ha destato l'attenzione degli studiosi.

Il PIANESE trovò lieve poichilocitosi, lievissima oligocromoemia e poco notevole anisocitosi; nessuna reazione normo o megaloblastica: leucopenia talvolta notevolissima; dei leucociti trovò in media il 35 % di linfociti, l'8 % di mononucleari grandi, 6 % di forme di passaggio, 1 % di eosinofili, 50 % di polinucleari neutrofili, nessun mielocita, nè leucocita basofilo; valore globulare 0,70, ma anche maggiore. L'A. soggiunge che questo reperto ematologico va vagliato con molta cautela, poichè se l'esame del sangue vien praticato nel primo inizio della malattia si riscontra reazione normoblastica e iperleucocitosi mielocitica e non leucopenia. E difatti in un caso trovò dapprima reazione normoblastica e iperleucocitosi, mentre dopo circa 7 mesi riscontrò leucopenia ed assenza di normoblasti.

Alle ricerche del PIANESE dobbiamo aggiungere quelle che nell'istesso periodo di tempo e poco dopo furono praticate a Tunisi da NICOLLE e dai suoi collaboratori, i quali riscontrarono costantemente notevole diminuzione dell'emoglobina, oligocromoemia e leucopenia talvolta intensa.

JAEGGY trovò in un caso degenerazione cromatofila accentuata, micro e macrociti, rari normoblasti, poichilociti e globuli bianchi degenerati. In un altro caso l'esame del sangue ripetuto 5 volte nello spazio di circa 2 mesi gli fece rilevare che il numero dei globuli bianchi da 6500 scese rapidamente a 3000

419
e i globuli rossi da 3.800.000 a 1.500.000. In questo caso trovò pure normoblasti, poichilociti e globuli bianchi in degenerazione.

Pure a Tunisi, E. e A. LEVY trovarono in un caso normoblasti, eosinofili e diminuzione rapida dei globuli bianchi (da 5000 a 1800 nel periodo di circa 2 mesi).

Nei casi di anemia da Leishmania pubblicati dal GABBI e dal FELETTI si è riscontrata diminuzione dei globuli rossi e bianchi e abbassamento del tasso emoglobinico. Il FELETTI, in 7 casi, trovò diminuzione dei polinucleari neutrofili e dei piccoli mononucleati, aumento dei mononucleati grandi e medi, assenza di eosinofili.

Nel N° 5 del corrente anno del periodico *la Pediatria* pubblicai le ricerche ematologiche fatte in 7 casi di anemia da Leishmania osservati nella nostra clinica fino allo scorso mese di marzo. Venni allora alle seguenti conclusioni:

Il *tasso emoglobinico* è sempre diminuito; i *globuli rossi* sono generalmente diminuiti di numero: in un solo caso trovai poichilocitosi, anisocitemia, normo e megaloblasti; in tutti gli altri, tranne una lieve policromatofilia, non osservai altro di importante; *valore globulare* di poco superiore o inferiore alla unità; *globuli bianchi* notevolmente vari di numero (massimo 20.000, minimo 7200).

La *formola leucocitaria* diede sempre predominio dei mononucleati e specialmente dei linfociti. Qualche mielocita neutrofilo, rari eosinofili, rarissimi basofili.

Contemporaneamente alle mie ricerche il TOMASELLI, della clinica del FELETTI, pubblicò i risultati avuti in 10 casi di anemia da Leishmania osservati a Catania. Nella metà di questi casi manca però la numerazione dei globuli rossi e dei globuli bianchi e il tasso emoglobinico. Il TOMASELLI trovò anemia talora intesa (globuli rossi 1.280.000), emoglobina diminuita, valore globulare elevato, globuli bianchi diminuiti di numero, aumento dei mononucleati grandi e medi, diminuzione dei linfociti, rari eosinofili; i globuli rossi non presentarono notevole alterazione di forma e di volume; osservò talora, più o meno accentuato, il fenomeno della cromatofilia; raramente vide qualche normoblasto.

*
* *

Dopo la pubblicazione delle mie ricerche furono osservati nella nostra clinica altri casi di anemia da Leishmania. Credo ora interessante pubblicare i risultati dell'esame del sangue, non solo come contributo allo studio ematologico di questa grave malattia, ma anche perchè le ultime ricerche mi hanno dato in alcuni casi risultati che differiscono da quelli avuti precedentemente.

Tralascio il riassunto delle storie cliniche dei piccoli infermi: in tutti i casi furono riscontrati gli stessi sintomi, più o meno gravi, ormai noti agli studiosi; in tutti fu constatata nel succo splenico la presenza dei parassiti di LEISHMANN. Mi limito solamente ad accennare in quali condizioni generali si trovavano i bambini e da quanto tempo erano approssimativamente ammalati al momento in cui venne praticato l'esame del sangue. E per brevità riassumo le ricerche nel seguente quadro:

791
X

292

Durata

Condizioni

Emoglobina
(Sahli) o/o

Red cells

Cell value

Numero	COGNOME e NOME	ETÀ	Durata della malattia	Condizioni dell' ammalato	Emoglobina (Sahli) o/o	Globuli rossi	Valore globulare
1.	Gambino Maria	mesi 20	1 anno	discrete	55	2.800.000	0,98
2.	Di Pace Francesco	mesi 7	3 mesi	deperite	55	2.375.000	1,17
3.	Alaimo Rosa	anni 2	2 mesi	discrete	60	4.500.000	0,66
4.	Di Maggio Benedetto	a. 2, m. 4	3 mesi	discrete	45	2.350.000	0,97
5.	Spatola Margherita	mesi 20	7 mesi	gravi	35	1.250.000	1,40
6.	D' Amico Francesco	a. 2, m. 5	1 mese	discrete	70	3.150.000	1,11
7.	» »		3 mesi	discrete	60	2.050.000	1,46
8.	Orlando Antonina	anni 2	1 mese	gravi	50	2.536.000	1,02
9.	» »		3 mesi	miglior.	52	2.500.000	1,04
10.	Corrier Francesca	mesi 15	1 mese	deperite	45	2.766.000	0,81
11.	Fontana Giuseppe	a. 2, m. 2	3 mesi	discrete	35	1.580.000	1,10
12.	Alconte Antonina	anni 3	1 anno	gravi	55	1.755.000	1,57
13.	» »		13 mesi	peggior.	50	1.750.000	1,42
14.	Tantillo Girolama	a. 2, m. 5	10 mesi	deperite	35	1.412.500	1,25
15.	Marchese Nunzia	a. 2, m. 8	5 mesi	discrete	65	4.550.000	0,71
16.	Giallombardo Angela	anni 3	8 mesi	discrete	50	3.028.125	0,76

Globuli bianchi	B Rapporto R	Polinucleati %			Mononucleati %	Linfociti %	Forme di passaggio %	ELEMENTI ANORMALI
		neutrofili	eosinofili	basofili				
8750	1:320	18,8	0	0	13,8	38,8	3,1	mielociti neutrofili 5,5 %
15620	1:151	18,6	1,4	0	18,8	51,7	5,8	mielociti neutrofili 4,7 %
8180	1:553	20,6	0	0	44,2	26,6	5,4	mielociti neutrofili 3,2 %
5700	1:412	—	—	—	—	—	—	
7035	1:177	—	—	—	—	—	—	
7500	1:420	18,5	0	0	33,3	38,8	7,4	mielociti neutrofili 1,8 %
6092	1:336	30	0	0	18,7	48,2	2,5	
8400	1:745	50	0	0	26,1	19	2,3	mielociti neutr. 2,3 %, pre- senza di megaloblasti
7186	1:347	26	1	0	19	47	6	mieloc. neutrof. 1 %
6000	1:461	11,1	0	0	6,9	77,7	2,7	
3000	1:526	—	—	—	—	—	—	
5000	1:351	65,8	0	0	12,1	17	4,8	
6250	1:280	—	—	—	—	—	—	
3200	1:441	49,4	0	0	17,8	28,2	2,6	mielociti neutrofili 2 %, poi- chilotici, eritroblasti 1 %
3490	1:1303	19,7	6,1	0	8,6	51,8	13,5	macro e microciti, poichiloc.
4400	1:688	32	0	0	12	48	8	poichilociti.

neutrophile myelocytes

megaloblasts present

poikiloblasts
erythroblasts

Da queste ricerche risulta:

1.° Il *tasso emoglobinico* è sempre diminuito e in alcuni casi arriva al 35 %.

2.° I *globuli rossi* sono generalmente diminuiti di numero; in 4 casi (5, 11, 12, 14), in condizioni gravi, non arrivano alla cifra di 2,000,000; in 2 casi invece (4, 15) si ha un numero di globuli rossi quasi normale. In generale i globuli rossi si dimostrano poveri di emoglobina; talvolta si è trovata lieve anisocitemia e lieve poichilocitosi; raramente reazione normo e megaloblastica. Frequente il fenomeno della cromatofilia.

3.° Il *valore globulare* è vario e da un massimo di 1,57 va a un minimo di 0,66.

4.° I *globuli bianchi*, in quasi tutti i bambini esaminati, sono diminuiti di numero. Tenendo conto che nell'età infantile il numero normale dei globuli bianchi va da 8000 a 10000, noi abbiamo in 2 casi (1, 3) cifra normale (8750-8130), e in un caso (2) cifra superiore alla normale (15620), mentre in tutti gli altri casi il numero dei globuli bianchi è inferiore al normale e in alcuni si ha una vera leucopenia.

La diminuzione di numero dei globuli bianchi non è, nei casi nostri, in relazione con la durata, nè con la gravità della malattia, poichè si è riscontrata leucopenia tanto all'inizio di essa (dopo un mese nel caso 8), quanto in periodo inoltrato (10 mesi nel caso 14, 8 mesi nel caso 16) e i bambini erano alcuni in condizioni generali discrete, altri in condizioni gravi.

5.° La *formola leucocitaria* non ha dato, come nelle prime ricerche, costante predominio dei mononucleati e specialmente dei linfociti (8, 12, 14) ho notato prevalenza dei polinucleati neutrofili, in un caso prevalenza dei mononucleati grandi e medii, in tutti gli altri prevalenza dei linfociti. È da notare che nel caso Orlando in un primo esame si ebbe prevalenza dei polinucleati, mentre in un secondo esame, praticato alla distanza di 2 mesi dal primo, si ebbe predominio dei linfociti.

In tre casi ho notato polinucleati eosinofili, i quali in un caso (15) raggiunsero la cifra di 6,1 %, e in nessun caso neutrofili.

Le forme di passaggio sono, in generale, diminuite di numero. Spesso riscontrai mielociti neutrofili, e in qualche caso globuli bianchi in degenerazione (*).

(*) In 4 esami di sangue manca la formola leucocitaria per una casuale dispersione dei preparati.

Riassumendo, in questa seconda serie di ricerche ematologiche nell'anemia da Leishmania, ho riscontrato oligocitemia, oligromoemia talvolta intensa, lieve e rara anisocitemia e poichilocitosi, rarissima reazione normo e megaloblastica, frequente il fenomeno della cromatofilia; globuli bianchi in generale diminuiti di numero e in alcuni casi intensa leucopenia; nella maggioranza dei casi prevalenza dei linfociti; raramente eosinofili, assenza di neutrofili, spesso mielociti neutrofili e in qualche caso globuli bianchi in degenerazione.

*
* *

Sulla costituzione del sangue nell'anemia da Leishmania resta ancora a delucidare la parte che riguarda il numero dei globuli bianchi.

Tutti gli autori sono d'accordo nel dire che si riscontra costantemente leucopenia; però il PIANESE, come ho già detto, fa notare che il reperto ematologico nell'anemia da Leishmania deve essere vagliato con molta cautela, non avendo un valore assoluto ma relativo al periodo del morbo nel quale l'esame del sangue vien praticato; egli infatti trovò, in un caso, all'inizio della malattia, non leucopenia, ma iperleucocitosi, e recentemente il LONGO in un caso a decorso rapido trovò 16000 globuli bianchi.

Dalle ricerche di JÄEGGY e LEVY pare che il numero dei globuli bianchi tenda a diminuire sempre più col progredire della malattia, fino a raggiungere cifre bassissime nel periodo finale di essa.

Nella nostra clinica non si è notata finoggi una costante diminuzione dei globuli bianchi nei casi che si poterono seguire per un certo tempo e qualcuno fino alla morte.

I risultati avuti non ci permettono di stabilire, come il PIANESE, che in un primo periodo vi sia leucocitosi e in seguito leucopenia, poichè in alcuni casi esaminati nel primo periodo della malattia abbiamo notato leucocitosi, in altri un numero di globuli bianchi normale, in altri ancora leucopenia.

Sarebbe interessante poter stabilire se dalla leucocitosi si passi gradatamente alla leucopenia, come si riscontra nel Kala-Kzar indiano, nel quale il LEISHMAN e il ROGERS hanno trovato che all'inizio della malattia si ha una mediocre leucocitosi,

mentre in seguito si osserva una spiccata leucopenia. Noi ci proponiamo di fare ricerche in proposito, quando riusciremo ad osservare casi di anemia da *Leishmania* all' inizio della malattia.

Bisogna però tener presente che quasi tutti i bambini affetti da anemia da *Leishmania*, nel decorso della malattia e specialmente nel periodo avanzato, vanno facilmente soggetti a complicanze organiche varie, per le quali la costituzione del sangue viene a subire qualche modificazione.

Occorre quindi uno studio molto accurato per poter arrivare a conclusioni ben fondate.

Palermo, Settembre 1910.

BIBLIOGRAFIA

PIANESE. — *Atti della R. Accademia med. chir. di Napoli*. 1908, pag. 162.

JAEGGY. — *Ann. de l' Institut Pasteur de Tunis*. 1909. IV.

E. e A. LEVY. — idem idem

GABBI. — Studi intorno ad alcune malattie tropicali della Calabria e della Sicilia. Roma 1910.

LISHMANN. — in *Mense*. Trattato delle malattie tropicali. 1909.

FELETTI. — *La Riforma medica*. 1910 50.

CANNATA. — *La Pediatria*, 1910. 5.

TOMASELLI. — *Riv. critica di clinica medica*. 1910. 22.

LONGO. — *Riv. di clinica pediatrica*. 1910.



